



Simorgh Darou Attar  
Pharmaceutical Co.

## LAXYLLIUM®

اسفرزه ممکن است در برخی موارد موجب نفخ، درد شکم، اسهال، سوء هاضمه و حالت تهوع و در بعضی موارد باعث بروز واکنش های آلرژیک شود.

### تداخلات:

اسفرزه ممکن است موجب کاهش سرعت و میزان جذب کاربامازپین شده و خطر تشنج را افزایش دهد.

مصرف این فرآورده همزمان با نمک های لیتیم موجب کاهش غلظت پلاسمایی لیتیم و وقفه در جذب آنها از مجرای گوارشی می گردد.

مصرف همزمان این فرآورده با داروی متفورمین ممکن است در جذب این دارو تداخل ایجاد نماید. برای جلوگیری از تغییر در جذب، پسیلیوم را ۳۰-۶۰ دقیقه بعد از متفورمین مصرف کنید.

### آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:

در طب سنتی از اسفرزه به عنوان ملین و ضد التهاب دستگاه گوارش و در درمان سندرم روده تحریک پذیر استفاده می شده است. اثر درمانی پسیلیوم به واسطه جذب آب توسط پوسته دانه (Husk) اسفرزه می باشد که ایجاد موسیلاژ فراوان می نماید و این امر سبب نرمی و افزایش حجم مواد در روده بزرگ شده و دفع آرام و طبیعی را میسر می سازد. از طرف دیگر ترکیبات موجود در پوسته دانه این گیاه، در کاهش کلسترول نقش موثری دارد.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

این فرآورده را می توان در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک مصرف کرد.

### شرایط نگهداری:

فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

### مرجع برگه راهنما:

Natural Medicines Comprehensive Database

ساخت شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار - نیشابور - ایران

Manufactured by Simorgh Darou Attar Pharmaceutical Co.

Neyshabur-IRAN.

آدرس: نیشابور، شهرک صنعتی خیام، نبش بهره وی ۳، پلاک ۱

www.simorghdarou.com

تلفن: ۴۳۲۶۷۹۴۲-۰۵۱

## لاکسیلیوم®

### پودر پوسته پسیلیوم

طبیعی

شکل فرآورده: کپسول

بسته بندی: ۳۰ عدد، به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی، به همراه برگه راهنما

در جعبه مقوایی

### اجزای فرآورده (ماده موثره):

هر کپسول حاوی:

پودر پوست دانه گیاه اسفرزه (Plantago ovate) ۵۰۰ میلی گرم

سایر ترکیبات: منیزیم استارات

استاندارد شده بر اساس حداقل ۱۵ درصد موسیلاژ در یک کپسول

### موارد مصرف:

ملین گیاهی

### روش و مقدار مصرف:

بزرگسالان: روزانه ۲-۳ عدد کپسول در صورت نیاز

نوجوانان بالای ۱۲ سال: روزانه ۲-۱ عدد کپسول

یا طبق دستور پزشک مصرف نمایند.

بهتر است لاکسیلیوم\* را شب به هنگام خواب و یا صبح ناشتا مصرف نمود.

نوشیدن یک یا چند لیوان آب اضافی بعد از مصرف این فرآورده ضروری می باشد.

### موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت ابتلا به بیماری های مزمن در صورت مصرف هرگونه دارو، مکمل و

یا گیاهان دارویی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

مصرف لاکسیلیوم\* درانسداد روده، پانکراتیت، آپاندیت و یا نشانه های آن،

خونریزی رکتوم (معقد) با علت نامشخص، زخم و چسبندگی قسمت هایی از

دستگاه گوارش و افرادی که اشکال در بلع دارند ممنوع است.

در کودکان کمتر از ۶ سال به جز با تجویز پزشک نباید مصرف شود.

مصرف حداقل ۸-۶ لیوان آب در روز برای کمک به نرم شدن مدفوع و

جلوگیری از کاهش آب بدن بیمار ضروری است. این امر به دلیل خروج حجم

زیادی از آب با مدفوع اهمیت دارد.

در صورت حساسیت به اجزا این فرآورده مصرف آن را قطع کرده و با پزشک و یا

داروساز خود مشورت کنید.

### عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته

شود اگر چه تمامی این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر

یک با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.