



Simorgh Darou Attar
Pharmaceutical Co.

SIMOVIT®

Vitamin A & D Drops

تداخلات:

ویتامین A: در صورت مصرف توام رتینوئید ها که از مشتقات ویتامین A می باشند با مکمل های ویتامین A باعث افزوده شدن اثرات سمی ویتامین A می شود.

ویتامین D: در صورت مصرف همزمان با آنتی اسیدهای آلومینیوم دار، باربیتورات ها، اتیدرونات، کلستیرامین، دیورتیک های تیازیدی و کورتون ها تداخلات دارویی گزارش شده است.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:

ویتامین D، یک ویتامین محلول در چربی است. غذاهای بسیار کمی به طور طبیعی حاوی ویتامین D هستند. قرار گرفتن مختصر در معرض نور خورشید کارآمدترین روش دریافت ویتامین D است. عملکرد اصلی ویتامین D تنظیم غلظت کلسیم و فسفر سرم است. ویتامین D کارایی جذب روده ای کلسیم را افزایش می دهد. در صورت عدم وجود ویتامین D کافی، فقط ۱۰٪ تا ۱۵٪ کلسیم جذب می شود و جذب فسفر فقط ۶۰٪ است. در حضور ویتامین D، جذب کلسیم به ۳۰٪ تا ۴۰٪ و جذب فسفر به ۸۰٪ افزایش می یابد. برخی شواهد نشان می دهد که مصرف مکمل ویتامین D در دوران نوزادی ممکن است از پیشرفت دیابت نوع ۱ در مراحل بعدی زندگی جلوگیری کند. ویتامین A: یک ویتامین محلول در چربی است. که برای بینایی، رشد و تکامل استخوان، مورد نیاز است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

کاربرد ندارد.

شرایط نگهداری:

فرآورده دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

فرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

مرجع برگه راهنما:

Natural Medicines Comprehensive Database

ساخت شرکت داروسازی سیمorgh داروی عطار - نیشابور - ایران

Manufactured by Simorgh Darou Attar Pharmaceutical Co.

Neyshabur-IRAN.

آدرس: نیشابور، شهرک صنعتی خیام، نیش بهره وری ۳، پلاک ۱

تلفن: ۰۵۱-۴۳۲۶۷۹۴۲

قطره سیموویت®

ویتامین A+D

مکمل

شکل فرآورده: قطره خوراکی (با طعم شیر)

بسته بندی: بطری ۳۰ میلی لیتری به همراه برگه راهنما در جعبه مقوایی.

اجزای فرآورده: (ماده موثره)

ویتامین A (به صورت پالمیتات) ۱۵۰۰ واحد بین المللی

ویتامین D₃ (کوله کلسیفرول) ۶۰۰ واحد بین المللی

سایر ترکیبات: ساکاروز، گلیسرین، سیتریک اسید، طعم دهنده شیر،

پتاسیم سوربات، پلی سوربات و آب مقطر

موارد مصرف:

کمک به تامین ویتامین های A و D

کمک به سلامت پوست، بینایی و استخوان

روش و مقدار مصرف:

مقدار مصرف معمول این فرآورده برای کودکان زیر ۴ سال از طریق خوراکی به میزان یک میلی لیتر روزانه یا طبق تجویز پزشک معالج است. در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مراجعه نمایید.

موارد احتیاط و منع مصرف:

این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد. بیش از مقدار توصیه شده از مکمل ها استفاده نکنید. در صورت مصرف هرگونه دارو یا مکمل دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید. بعد از باز کردن درب ظرف و قراردادن قطره چکان بر روی آن، ترجیحا داخل یخچال نگهداری شود و فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل مصرف می باشد.

عوارض جانبی:

هر مکمل به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. از جمله این عوارض شامل تحریک دستگاه گوارش، درد شکم، یبوست، اسهال و تهوع می باشد.