



Simorgh Darou Attar
Pharmaceutical Co.

SIMOVIT®

Vitamin D3
1000 IU

قطره سیموویت®

ویتامین D3
۱۰۰۰ واحد بین المللی

مکمل

شکل فرآورده: قطره خوراکی

بسته بندی: بطری ۳۰ میلی لیتری به همراه برگه راهنما در جعبه مقوایی

اجزای فرآورده (ماده موثره):

هر یک میلی لیتر حاوی:

ویتامین D3 ۱۰۰۰ واحد بین المللی

سایر ترکیبات: بوتیلیند هیدروکسی آنیزول، روغن زیتون، اسانس پرتقال

موارد مصرف:

کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر

کمک به سلامت سیستم ایمنی

روش و مقدار مصرف:

روزانه یک میلی لیتر بعد از غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف گردد.

قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید.

درب بطری بعد از هر بار مصرف محکم بسته شود.

موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده ها/داروها و یا حساسیت به

اجزای این فرآورده، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در بیماران با نارسایی کلیوی و افراد مبتلا به بیماری های مزمن مانند

سارکونیدوز، پرکاری تیروئید و هایپرکلسمی قبل از مصرف این فرآورده با

پزشک مشورت شود. از مصرف بیش از حد فرآورده خودداری نمایید. این

فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری

نیمی باشد.

عوارض جانبی:

هر مکمل به موازات اثرات مطلوب ممکن است سبب بروز برخی عوارض

ناخواسته شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در

صورت بروز هریک از آن ها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. از

جمله عوارض جانبی که با مصرف مقادیر بیش از حد ویتامین D3 دیده

می شود شامل استفراغ، تکرر ادرار، تشنگی و یا خشکی دهان می باشد.

تداخلات:

ویتامین D ممکن است جذب آلومینیوم را افزایش دهد، مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی با تجویز پزشک صورت گیرد.

آترواستاتین و کلسی پوتریول با این فرآورده به دلیل حضور ویتامین D تداخل دارند. مصرف همزمان این داروها با فرآورده با مشورت پزشک بلا مانع است.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:

ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است.

عملکرد اصلی ویتامین D تنظیم غلظت کلسیم و فسفر سرم است.

در صورت عدم وجود ویتامین D کافی، جذب کلسیم و فسفر در روده به

طور چشمگیری کاهش می یابد. ویتامین D با افزایش قدرت عضلانی و

عملکرد عصبی عضلانی موجب تقویت استخوان ها می شود و در نتیجه،

در پیشگیری از پوکی استخوان نقش دارد. نقش بارز ویتامین D در بهبود

عملکرد سیستم ایمنی ثابت شده است. افزایش این ویتامین با کاهش ریسک

بیماری های خودایمنی (همچون روماتیسم مفصلی)، دیابت و سرطان های کولون،

سینه و پروستات همراه است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده درون جعبه، در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد، به دور از نور و

رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

مرجع برگه راهنما:

Natural Medicines Comprehensive Database

ساخت شرکت داروسازی سیمقر داروی عطار- نیشابور-ایران

Manufactured by Simorgh Darou Attar Pharmaceutical Co.

Neyshabur-IRAN.

آدرس: نیشابور، شهرک صنعتی خیام، نش بهره وی ۳، پلاک ۱

تلفن: ۰۵۱-۴۲۲۶۷۹۴۲