



SDA

Simorgh Darou Attar  
Pharmaceutical Industry Co.

## Argifull® L-Arginine 500 mg

در یک فرد دیده نشود ولی در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت کنید. شایع ترین عوارض جانبی، شامل اختلالات دستگاه گوارش از جمله درد شکم، نفخ، حالت تهوع، اسهال، همچنین سردرد، بی خوابی و گرگرفتگی می باشد.

### تداخلات:

تداخل دارویی خاصی با مصرف این فرآورده گزارش نشده است.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به علت کافی نبودن مطالعات انجام شده، توصیه نمی شود.

### اثر فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:

ال-آرژینین یک اسید آمینه ضروری برای ساخت پروتئین است که بیشتر به علت اثرات عروقی آن شناخته شده است. ال-آرژینین در دیواره عروق به نیتریک اکساید تبدیل می شود که موجب اتساع عروق می گردد. همچنین می تواند عملکرد اندوتلیال کرونر را بهبود بخشد و چسبندگی سلول های مونوسیت/ اندوتلیال را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) یا هیپرکلسترولمی کاهش دهد و در نتیجه جریان خون کرونر را افزایش دهد. ال-آرژینین می تواند موجب افزایش ترشح هورمون رشد، پرولاکتین، گلوکاگون و انسولین گردد. همچنین سطح تستوسترون را در مردان افزایش می دهد.

### شرایط نگهداری

فرآورده درون جعبه، دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

### مرجع برگه راهنما

Natural Medicines Comprehensive Database

فرآورده شرکت سیمرغ داروی عطار - نیشابور - ایران

Manufactured by Simorgh Darou Attar Pharmaceutical Co.  
Neyshabur-IRAN.

آدرس: نیشابور- شهرک صنعتی خیام- نیش بلوار بهره وری ۳ پلاک ۱

تلفن: ۰۵۱۴۳۲۶۷۹۴۲

## آرژینی فول®

### ال-آرژینین ۵۰۰ میلی گرم

مکمل

شکل فرآورده: کپسول ژلاتینی نرم (Softgel)

بسته بندی: حاوی ۳۰ عدد سافت ژل (۲ بلیستر ۱۵ عددی) به همراه برگه راهنما در جعبه مقوایی.

### اجزای فرآورده: (مواد مؤثره)

هر سافت ژل حاوی:

ال-آرژینین (به صورت ال-آرژینین هیدروکلراید) ۵۰۰ میلی گرم  
سایر ترکیبات: روغن سویا، روغن آفتابگردان، لسیتین سویا، بیژوکس، ویتامین ای، ژلاتین، گلیسرین، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، رنگ مجاز، اسانس توت فرنگی، آب خالص.

### موارد مصرف:

کمک به گشادای عروق و افزایش جریان خون

کمک به قوای جنسی

کمک به عضله سازی

تحریک ترشح هورمون رشد

تقویت سیستم ایمنی

### روش و مقدار مصرف:

روزانه ۲ الی ۴ عدد سافت ژل بین وعده های غذایی همراه یک لیوان آب و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

### موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت مصرف هر گونه دارو، مکمل یا گیاهان دارویی، در صورت ابتلا به بیماریهای مزمن، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید. در صورت بروز حساسیت به هر یک از اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.

حداقل ۲ هفته قبل از عمل جراحی، مصرف این فرآورده را طبق نظر پزشک متوقف کنید. این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.

### عوارض جانبی:

هر مکمل به موازات اثرات مطلوب ممکن است در برخی افراد سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگرچه ممکن است که تمامی این عوارض